



Jak się przygotować do transferu mikrobioty jelitowej metodą kapsułkową – Mbiotix HBI caps.?

- 24 godziny przed zabiegiem transferu mikrobioty jelitowej należy przyjąć inhibitor pompy protonowej (PPI) 2x20 mg i kontynuować przyjmowanie przez 48 godzin po zabiegu. Leki te dostępne również w formie OTC – bez recepty.
- 1 godzinę przed zabiegiem w przypadku odruchów wymiotnych należy przyjąć lek p/wymiotny np. Aviomarin, Diphergan.
- U pacjentów z przyspieszonym pasażem jelitowym należy przyjąć loperamid w dniu zabiegu.
- W dniu zaplanowanego transferu mikrobioty jelitowej należy zgłosić się do Centrum 15 minut przed planowanym zabiegiem, na czczo. Jeśli Pacjent przyjmuje rano leki na stałe, to należy je przyjąć, popijając małą ilością wody.
- Do Centrum proszę zabrać butelkę wody niegazowanej 1-1,5 l.
- Po transferze mikrobioty jelitowej należy pozostawać na czczo przez 2 godziny.

Zapalenie jelit o etiologii Clostridioides difficile

Jeśli wskazaniem do przeprowadzenia transferu mikrobioty jelitowej jest nawrotowe zapalenie jelit o etiologii Clostridioides difficile, to transfer powinien odbyć się po zakończonym pełnym leczeniu kolejnego nawrotu zapalenia, po ustąpieniu biegunki, najlepiej na drugi dzień po zakończonej antybiotykoterapii.

Nieswoiste zapalenia jelit np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna

Jeśli wskazaniem do przeprowadzenia transferu mikrobioty jelitowej są nieswoiste zapalenia jelit, to transfer powinien odbyć się w fazie remisji choroby.